

MCQ – FORKLARING

På neste side kan du se eksempel på hvordan spørsmålene i ALNSFs MCQ ser ut.

Hvert spørsmål eller påstand har 5 svar, som alle skal besvares. Svarene som står er enten riktige eller gale.

Måten du svarer på er å krysse av i rubrikkene på høyre side, under R, ? eller G. Poengene blir regnet på følgende måte: Du får pluss ett poeng for riktig svar, du får minus ett poeng for galt svar og krysser du av under ? får du null poeng.

Kandidat nummer: _____

1	MAC:	R	?	G
<i>a)</i>	MAC kan defineres som den konsentrasjonene av en anestesigass som skal til for at 50% av pasientene ligger stille ved hudinsisjon.			
<i>b)</i>	Sier noe om et inhalasjonsanestetikums potens.			
<i>c)</i>	Sier noe om et inhalasjonsanestetikums løslighet.			
<i>d)</i>	Er avhengig av pasientens alder.			
<i>e)</i>	1 MAC av et inhalasjonsanestetikum gir alltid optimal anestesi.			

2	Medikamenter som brukes til innledning av generell anestesi kan gi følgende sirkulatoriske effekter:	R	?	G
<i>a)</i>	Nedsatt hjerte-minuttvolum.			
<i>b)</i>	Vasodilatasjon.			
<i>c)</i>	Hemmet sympatisk aktivitet.			
<i>d)</i>	Økt tonus i bronkialmuskulatur.			
<i>e)</i>	Pulsøkning.			

3	Ved larynxspasme kan pasienten:	R	?	G
<i>a)</i>	Ha hørlig inspiratorisk stridor.			
<i>b)</i>	Ofte ha noe som irriterer stemmebåndene.			
<i>c)</i>	Av og til ha paradoks respirasjonsbevegelse.			
<i>d)</i>	Ha blitt utsatt for kirurgisk stimulering i for lett anestesi.			
<i>e)</i>	Aldri ha asfyksi tegn.			

4	Intravenøse anestetika kan utløse en anafylaktisk reaksjon:	R	?	G
<i>a)</i>	Anafylaktiske reaksjoner er sjeldnere hos barn enn hos voksne.			
<i>b)</i>	Gravide er mer utsatt for anafylaktisk reaksjon enn andre.			
<i>c)</i>	Anafylaktisk reaksjon sees hyppigere hos menn enn hos kvinner.			
<i>d)</i>	Tidligere eksponering for stoffet er nødvendig for at en reaksjon skal utløses.			
<i>e)</i>	Anafylaktisk reaksjon på tiopental (Pentothal-Natrium) er mer vanlig enn anafylaktisk reaksjon på propofol (Diprivan/ Propolipid).			